



## Les comportements sexuels et l'orientation sexuelle des jeunes de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

### Principaux résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023

## **Rédaction du rapport et analyse des données**

Lisa-Marie Jalbert, agente de planification, programmation et recherche – surveillance de l'état de santé

## **Révision du contenu**

Ariane Courville, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive

## **Rédaction et révision de la section « Les actions en place »**

Marie-Claude Tremblay, répondante régionale Sexualité saine et responsable, Santé et bien-être des LGBTQ+, Santé et bien-être des Femmes

Geneviève Thériault, conseillère clinique en maladies infectieuses, répondante régionale du dossier ITSS/SIDEP

## **Révision linguistique et orthographique**

Julie Dubé, agente administrative

## **Production et diffusion**

Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

144, boulevard Gaspé

Gaspé (Québec) G4X 1A9

## **Dépôt légal**

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025

Bibliothèques et Archives Canada, 2025

ISBN : 978-2-555-01459-6 (version PDF)

## Table des matières

Introduction .....	4
Les relations sexuelles consensuelles .....	5
La précocité de la première relation sexuelle consensuelle .....	7
Le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie .....	9
L'utilisation du condom .....	11
L'utilisation de méthodes contraceptives autres que le condom.....	13
L'utilisation d'un condom et d'une méthode de contraception régulière .....	16
L'utilisation de la contraception orale d'urgence .....	18
Attrance sexuelle et sexe des partenaires sexuels .....	20
Les comportements sexuels selon certaines caractéristiques.....	23
Les actions en place .....	25
Conclusion.....	26
Bibliographie .....	28
Annexe 1 : Évolution 2010-2011 à 2022-2023 par RLS.....	29

# Introduction

---

L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) aux 6 ans, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce document présente les résultats de l'édition 2022-2023, il s'agit de la troisième édition de l'enquête, la première édition ayant eu lieu en 2010-2011 et la deuxième en 2016-2017. L'enquête vise l'ensemble des élèves inscrits dans les écoles secondaires du Québec, que ce soit les écoles francophones ou anglophones, publiques ou privées. Les résultats sont disponibles aux échelles provinciales, régionales et locales. Les régions sociosanitaires des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik sont toutefois exclues. Les résultats à l'échelle régionale et locale peuvent parfois être imprécis et doivent être mis en contexte en utilisant d'autres sources d'information sur les caractéristiques du territoire géographique concerné.

En 2022-2023, au Québec, 70 825 élèves de secondaire 1 à 5, dans 483 écoles, ont participé à l'enquête, avec un taux de réponse de 88 %. En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2 976 élèves dans 18 écoles ont participé à la collecte de données pour un taux de réponse de 86 %. La collecte de données a eu lieu du 7 novembre 2022 au 17 mai 2023. Des membres du personnel de l'ISQ se sont rendus dans les classes pour que les élèves répondent aux questionnaires. La durée de complétion était d'environ 30 minutes. Dans le cadre de l'EQSJS, les résultats de certains indicateurs peuvent être affectés par la période où les données ont été collectées (avant les Fêtes/après les Fêtes). Lorsque c'est le cas, les données sont ajustées afin d'éliminer l'effet de la période de collecte.

Cette enquête a comme objectif de dresser un portrait de l'état de santé des élèves du secondaire dans les régions du Québec. Les thèmes des habitudes de vie, de la santé physique et mentale et de l'adaptation sociale sont abordés. Enfin, comme l'édition 2022-2023 est la troisième de cette enquête, l'objectif est de voir l'évolution de l'état de santé et de ses déterminants depuis les 12 dernières années.

Ce document présente les principaux résultats de l'EQSJS 2022-2023 sur les comportements sexuels adoptés par les élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Différents sujets sont abordés tels que l'âge lors de la première relation sexuelle consensuelle, le nombre de partenaires sexuels, l'utilisation du condom et des différentes méthodes de contraception ainsi que l'attrance sexuelle et le sexe des partenaires sexuels.

Pour plus de détails sur la méthodologie de l'EQSJS, vous pouvez vous référer au document méthodologique complet ([Boucher et Tremblay, 2024](#)). Vous pouvez également vous référer au document présentant l'ensemble des résultats provinciaux ([Traoré, Simard et Julien, 2024](#)).

## Notes pour la compréhension du document :

Les données sont présentées par genre plutôt que par sexe. « Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer du sexe assigné à la naissance ». La question posée était « Quel est ton genre? » et les choix de réponse : « Masculin », « Féminin » et « Ou s'il te plaît, précise ». En raison des petits nombres et pour préserver la confidentialité et la qualité des estimations, la catégorie non binaire n'est pas présentée. Les personnes non binaires sont incluses de façon aléatoire dans l'un ou l'autre des genres, ainsi les catégories sont nommées « Filles+ » et « Garçons+ » (Traoré, Simard et Julien, 2024, p.753).

Dans le document, nous présentons des données selon le plus haut niveau de scolarité des parents, l'objectif étant de mettre en évidence les inégalités sociales de santé en lien avec l'éducation. Les jeunes ne connaissent pas nécessairement le revenu du ménage, tandis que le niveau de scolarité de leur parent est généralement connu.

Pour les territoires locaux, les données présentées sont celles par Réseaux locaux de services (RLS) à l'exception des territoires d'Avignon et de Bonaventure qui sont les Municipalités régionales de comté (MRC).

# Les relations sexuelles consentues

## En 2022-2023

**42 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont déjà eu une relation sexuelle consentue (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie.

## Évolution depuis 2010-2011

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion d'élèves du secondaire ayant eu **au moins une relation sexuelle consentue** au cours de leur vie (tous types confondus) a **diminué** entre 2010-2011 et 2022-2023, passant de 48 % à 42 % (tableau 1). Cette baisse est observée chez les filles (52 % contre 46 %) et chez les garçons (45 % contre 39 %) (données non illustrées). Au Québec, cette proportion est en constante diminution passant de 37 % en 2010-2011 à 30 % en 2022-2023 (données non illustrées).

## Comparaison avec le Québec

En 2022-2023, les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont proportionnellement **plus nombreux** que ceux du Québec à avoir déjà eu une relation sexuelle consentue (42 % contre 30 %) (tableau 1). Ce constat est fait chez les filles (46 % contre 31 %) et chez les garçons (39 % contre 29 %) (tableau 1, données québécoises non illustrées). Il en va de même pour tous les niveaux scolaires (données non illustrées).

## Caractéristiques associées au fait d'avoir déjà eu une relation sexuelle consentue

Comme au Québec, les **filles** sont plus susceptibles que les garçons d'avoir eu au moins une relation sexuelle consentue au cours de leur vie en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (46 % contre 39 %) (tableau 1).

Dans la région, les élèves du **2<sup>e</sup> cycle** (3<sup>e</sup> à 5<sup>e</sup> secondaire) sont plus nombreux, en proportion, à avoir eu une relation sexuelle consentue au cours de leur vie que les élèves du 1<sup>er</sup> cycle (46% contre 23 %) (tableau 2). De plus, les **élèves des écoles francophones** sont plus nombreux, en proportion, à avoir eu des relations sexuelles que ceux des écoles anglophones (43 % contre 29 %) (tableau 2). Au niveau des territoires locaux, ceux du **Rocher-Percé** et d'**Avignon** se distinguent en présentant des proportions significativement supérieures à celle du reste de la région (tableau 1).

**Tableau 1 : Proportion (%) des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consentue au cours de leur vie**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
Ont eu au moins une relation sexuelle consentue (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	48,4 <sup>a,b</sup>	43,2 <sup>a</sup>	42,5 <sup>b</sup>	30,2	(+)	39,1 (+) <sup>a</sup>	45,8 (+) <sup>a</sup>	48,0 (++)	38,0	43,1	49,4 (++)	39,2	40,0	39,1

**Tableau 2 : Proportion (%) des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire <sup>1</sup>		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Sans diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	23,4 <sup>a</sup>	45,8 <sup>a</sup>	43,4 <sup>a</sup>	29,2 <sup>a</sup>	44,9	42,6	43,1

<sup>a, b</sup> Pour une variable de croisement (cycle d'enquête, genre, niveau scolaire, langue d'enseignement), les catégories avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

(++) Valeur significativement supérieure à celle du reste de la région au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

<sup>1</sup> Les élèves de premier cycle deuxième font référence à ceux de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> secondaire et les élèves de deuxième cycle font référence à ceux de 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> secondaire.

# La précocité de la première relation sexuelle consensuelle

En 2022-2023

**12 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont eu une première relation sexuelle consensuelle avant l’âge de 14 ans.

## Évolution depuis 2010-2011

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en 2022-2023, la proportion de jeunes de 14 ans et plus au secondaire ayant eu une première relation sexuelle avant d’avoir 14 ans demeure significativement plus faible que celle observée en 2010-2011, en passant de 15 % à 12 % (tableau 3). Cette proportion n’a pas varié significativement entre 2016-2017 et 2022-2023.

## Comparaison avec le Québec

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les élèves de 14 ans et plus sont **plus nombreux**, en proportion, à avoir eu une première relation sexuelle avant d’avoir 14 ans en comparaison à ceux du Québec (12 % contre 7 %) (tableau 3). Ce constat est observé chez les garçons (11 % contre 7 %) et chez les filles (14 % contre 7 %) (tableau 3, données québécoises non illustrées).

## Caractéristiques associées à la précocité de la première relation sexuelle consensuelle

Dans la région comme au Québec, aucun écart significatif n’est décelé entre les garçons et les filles (tableau 3). Aussi, l’enquête n’a pas permis de détecter une différence significative entre les élèves dont la langue d’enseignement de l’école est le français et ceux dont la langue d’enseignement est l’anglais (tableau 4). Toutefois, on observe que la proportion d’élèves de 14 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle avant l’âge de 14 ans est significativement plus faible parmi ceux dont au moins un des parents présente un niveau de scolarité supérieur au DES (tableau 4).

Lorsqu’on examine les résultats selon les territoires locaux de l’école, on constate une proportion significativement plus élevée d’élèves du secondaire dans **Rocher-Percé** ayant eu première relation sexuelle consensuelle avant l’âge de 14 ans en comparaison au reste de la région (tableau 3).

**Tableau 3 : Proportion (%) des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l’âge de 14 ans**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l’âge de 14 ans	15,3 <sup>a,b</sup>	10,6 <sup>a</sup>	12,3 <sup>b</sup>	6,7	(+)	10,9 (+)	13,6 (+)	13,7	9,3*	11,6	18,8 (++)	10,3	12,1*	9,0*

**Tableau 4 : Proportion (%) des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Sans diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	13,2*	12,1	12,8	5,3**	18,8 <sup>a</sup>	16,6 <sup>b</sup>	11,0 <sup>a,b</sup>

<sup>a, b</sup> Pour une variable de croisement (cycle d'enquête, niveau de scolarité des parents), les catégories avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

(++) Valeur significativement supérieure à celle du reste de la région au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# Le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie

## En 2022-2023

**30 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ayant déjà eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) ont eu **trois partenaires sexuels ou plus** au cours de leur vie (20 % des jeunes ont eu deux partenaires sexuels et 50 % ont eu un seul partenaire sexuel au cours de leur vie).

## Évolution depuis 2016-2017

En ce qui concerne l'évolution du nombre de partenaires sexuels au cours de la vie, aucune différence significative n'a été détectée entre l'édition de 2016-2017 et celle de 2022-2023; la proportion d'élèves de 14 ans et plus qui ont eu trois partenaires sexuels ou plus étant passée de 29 % en 2016-2017 à 30 % en 2022-2023 (tableau 5). Au Québec, cette proportion a connu une légère baisse en passant de 31 % en 2016-2017 à 28 % en 2022-2023 (données non illustrées).

## Comparaison avec le Québec

Comme c'était aussi le cas en 2016-2017, on ne note pas de différence significative entre la proportion de jeunes du secondaire qui ont eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine comparativement au reste du Québec (30 % contre 28 %) (tableau 5).

## Caractéristiques associées au fait d'avoir eu trois partenaires sexuels ou plus

Comme lors de l'édition de 2016-2017, les analyses régionales ne montrent aucune différence significative entre les garçons et les filles ni entre les francophones et les anglophones quant au fait d'avoir eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de la vie (tableaux 5 et 6). Aussi, aucun territoire local ne ressort significativement par rapport au reste de la région (tableau 5). Toutefois, on note une proportion significativement plus élevée de jeunes du secondaire qui ont eu trois partenaires sexuels ou plus parmi les élèves du **2<sup>e</sup> cycle** (31 %) en comparaison aux élèves du 1<sup>er</sup> cycle (15 %\*\*) (tableau 6).

**Tableau 5 : Proportion (%) des élèves de 14 ans et plus au secondaire ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) qui ont eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
Ont eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie chez les jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle	NP	29,2	<b>29,9</b>	28,1	NS	29,9	30,0	28,9	23,1*	26,4	35,1	30,8	32,9	27,8*

NP (donnée non présentée) : Depuis l'édition de l'enquête en 2016-2017, il n'est pas possible de comparer les données de cet indicateur avec celles de 2010-2011, car les questions ont changé.

**Tableau 6 : Proportion (%) des élèves de 14 ans et plus au secondaire ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) qui ont eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Pas de diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie chez les jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle	14,9** <sup>a</sup>	31,3 <sup>a</sup>	30,4	20,1**	31,7*	27,0*	30,3

<sup>a</sup> Pour une variable de croisement (niveau scolaire), les catégories avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# L'utilisation du condom

---

## En 2022-2023

**53 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont utilisé le **condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale** consensuelle.

**42 %** ont utilisé le **condom lors de leur dernière relation sexuelle anale** consensuelle.

## Évolution depuis 2010-2011

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion d'élèves du secondaire de 14 ans et plus qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale a connu une **baisse** significative entre 2010-2011 et 2022-2023 en passant de 64 % à 53 % (tableau 7). On constate aussi une baisse significative de la proportion de jeunes ayant utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle anale consensuelle, la proportion d'utilisateurs dans la région étant passée de 56 % en 2010-2011 à 42 % en 2022-2023 (tableau 5).

## Comparaison avec le Québec

Comme à l'édition de 2016-2017, en 2022-2023, la proportion d'élèves du secondaire qui ont utilisé le condom lors de leur dernière **relation sexuelle vaginale** est significativement **plus faible** en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu'au Québec (53 % contre 61 %) (tableau 7). Cet écart est principalement observé chez les garçons (57 % contre 66 % au Québec) (tableau 7, donnée québécoise non illustrée). On observe également une proportion de jeunes ayant utilisé un condom lors de leur dernière **relation sexuelle anale** plus faible dans la région (42 % contre 53 % au Québec) (tableau 7).

## Caractéristiques associées à l'usage du condom

Au Québec, les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les **filles** à avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale (66 % contre 55 %) ou anale (58 % contre 49 %) (données non illustrées). En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, une tendance similaire est observée bien que les écarts ne soient pas significatifs (tableau 7). Pour ce qui est du niveau scolaire, les **élèves du 2<sup>e</sup> cycle** sont moins nombreux, en proportion, à avoir utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale en comparaison à ceux du 1<sup>er</sup> cycle (52 % contre 69 %) (tableau 8).

L'enquête ne permet pas de détecter de différences significatives quant à la langue d'enseignement et le plus haut niveau de scolarité des parents (tableau 8). Enfin, les résultats des territoires locaux indiquent une proportion plus faible d'élèves des écoles secondaires du **Rocher-Percé** qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle anale en comparaison au reste de la région (25 %\* contre 51 % pour le reste de la région) (tableau 7, donnée du reste de la région non illustrée).

**Tableau 7 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle consensuelle vaginale ou anale**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <b>vaginale</b> consensuelle	63,9 <sup>a,b</sup>	56,0 <sup>a</sup>	<b>53,2<sup>b</sup></b>	60,8	(-)	57,2 (-)	50,0	58,8	55,2	57,3	49,7	51,8	52,5	49,6
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <b>anale</b> consensuelle	56,4 <sup>a</sup>	48,6	<b>42,2<sup>a</sup></b>	53,4	(-)	46,7	38,6	X	X	52,9	25,5*(-)	46,9*	43,1**	57,2*

**Tableau 8 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle consensuelle vaginale ou anale, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Pas de diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <b>vaginale</b> consensuelle	69,4 <sup>a</sup>	51,9 <sup>a</sup>	52,9	60,3*	62,8	60,1	50,4
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <b>anale</b> consensuelle	X	X	X	X	34,6**	45,9**	42,6

<sup>a,b</sup> Pour une variable de croisement (cycle d'enquête, niveau scolaire), les catégories avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste de la région au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# L'utilisation de méthodes contraceptives autres que le condom

## En 2022-2023

- 87 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont utilisé **au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue durée d'action** lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
- 82 %** ont utilisé des **méthodes hormonales** (pilule contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera) comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
- 9 %** ont utilisé des méthodes de contraception **à longue action** (stérilet, implant contraceptif) comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
- 3,1 %\*** ont utilisé des **méthodes barrières** (diaphragme, cape cervicale, condom féminin) comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
- 6 %\*** ont utilisé des **méthodes naturelles** (calendrier, méthode symptothermique, méthode Billings) comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
- 47 %** ont utilisé le **coït interrompu** comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.

## Évolution depuis 2016-2017

Globalement, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion d'élèves du secondaire qui ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue durée d'action lors de leur dernière relation sexuelle vaginale n'a pas varié significativement entre l'édition 2016-2017 et celle de 2022-2023 (tableau 9). Cependant, on observe une **hausse** significative de la proportion de jeunes ayant eu recours aux **méthodes à longue action** (stérilet ou implant contraceptif) pour éviter la grossesse lors de leur dernière relation sexuelle vaginale (6 %\* en 2016-2017 contre 9 % en 2022-2023) (tableau 9).

## Comparaison avec le Québec

Dans la région, parmi les élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie, environ 87 % ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de leur dernière relation sexuelle vaginale, une proportion significativement **plus élevée** qu'au Québec (70 %) (tableau 9). Cet écart significatif est principalement constaté en ce qui concerne la proportion d'élèves ayant eu recours aux **méthodes hormonales** (82 % contre 65 %) (tableau 9).

## Caractéristiques associées à l'utilisation de méthodes contraceptives autre que le condom

Dans la région, les **garçons** sont plus nombreux, en proportion, à avoir eu recours aux **méthodes à longue action** et aux **méthodes naturelles** lors de leur dernière relation sexuelle vaginale en comparaison aux filles (tableau 9). Les **élèves de 2<sup>e</sup> cycle** sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu recours à au moins une

méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale en comparaison aux élèves de 1<sup>er</sup> cycle (88 % contre 76 %) (tableau 10). Parmi les élèves de 14 ans et plus ayant eu une relation sexuelle consensuelle vaginale, ceux dont les parents ont un niveau de scolarité inférieur au diplôme d'études secondaires sont moins nombreux, en proportion, que ceux dont au moins un parent a fait des études collégiales ou universitaires à avoir utilisé au moins une de ces méthodes contraceptives lors de leur dernière relation sexuelle vaginale (tableau 10).

Les résultats ne permettent pas de détecter une différence significative entre l'utilisation d'au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue durée d'action lors de la dernière relation sexuelle consensuelle vaginale et la langue d'enseignement (tableau 10).

**Tableau 9 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé d'autres méthodes contraceptives que le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
<b>MÉTHODES CONTRACEPTIVES</b>														
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, barrière ou à longue durée d'action	ND	86,6	<b>87,0</b>	70,1	(+)	84,9 (+)	88,7 (+)	88,1	91,5	89,6	85,6	86,3	81,7	88,6
<b>Méthodes hormonales</b>														
Ont utilisé une méthode hormonale	ND	82,3	<b>81,6</b>	64,7	(+)	79,8 (+)	83,0 (+)	81,1	81,6	81,3	81,4	80,4	78,6	88,6
<b>Méthodes barrières</b>														
Ont utilisé une méthode barrière	ND	3,6*	<b>3,1*</b>	2,4	NS	4,3**	2,1**	X	X	3,9**	X	X	6,0**	X
<b>Méthodes à longue durée d'action</b>														
Ont utilisé une méthode contraceptive à longue action	ND	5,8* <sup>a</sup>	<b>9,4<sup>a</sup></b>	8,1	NS	12,0* (+) <sup>a</sup>	7,3* <sup>a</sup>	14,1* (++)	14,7*	14,4* (++)	8,0**	8,2**	7,7**	X
<b>Coït interrompu</b>														
Ont utilisé le coït interrompu	ND	47,9	<b>47,1</b>	43,4	NS	46,9	47,2	47,4	46,5	47,0	44,3	49,0	47,7	48,1
<b>Méthodes naturelles</b>														
Ont utilisé une méthode naturelle	ND	7,4	<b>5,5*</b>	5,9	NS	8,1* <sup>a</sup>	3,5** <sup>a</sup>	X	X	X	3,7**	6,5**	X	6,2**

**Tableau 10 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé d'autres méthodes contraceptives que le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Pas de diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
<b>MÉTHODES CONTRACEPTIVES</b> Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, barrière ou à longue durée d'action lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	75,5 <sup>a</sup>	87,9 <sup>a</sup>	87,2	82,0	70,0 <sup>a, b</sup>	89,0 <sup>a</sup>	88,7 <sup>b</sup>

ND (donnée non disponible) : L'utilisation des méthodes contraceptives autres que le condom n'a pas été mesurée en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Les catégories d'une variable de croisement (cycle d'enquête, genre, niveau scolaire, plus haut niveau de scolarité des parents) avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

NS Valeur non significativement différente de celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

(++) Valeur significativement supérieure à celle du reste de la région au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# L'utilisation d'un condom et d'une méthode de contraception régulière

## En 2022-2023

**44 %** des élèves de 14 ans et plus au secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont utilisé **à la fois le condom et une méthode contraceptive régulière** (méthode hormonale ou stérilet) lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle (double protection).

**9 %** ont utilisé le **condom sans méthode de contraception régulière** lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.

**42 %** ont utilisé une **méthode de contraception régulière sans le condom** lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.

**5 %\*** n'ont utilisé **ni le condom ni une méthode de contraception régulière** lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.

## Évolution depuis 2016-2017

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion d'élèves du secondaire qui ont eu recours à une double protection lors de leur dernière relation sexuelle vaginale n'a pas varié significativement entre 2016-2017 (46 %) et 2022-2023 (44 %) (tableau 11). Un même constat s'applique également en ce concerne la proportion d'élèves qui ont seulement utilisé le condom (10 % contre 9 %), la proportion d'élèves qui ont seulement utilisé une méthode de contraception régulière (40 % contre 42 %) et la proportion d'élèves qui n'ont utilisé ni le condom ni la contraception régulière (4,2 %\* contre 4,8 %\*) (tableau 11).

## Comparaison avec le Québec

Selon l'EQSJS 2022-2023, dans la région, la proportion d'élèves de 14 ans et plus qui ont utilisé une **double protection** lors de leur dernière relation sexuelle vaginale est significativement **plus élevée** qu'au Québec (44 % contre 38 %) (tableau 11). Cet écart est principalement attribuable aux garçons (47 % contre 40 %) (tableau 11, donnée québécoise non illustrée). Les jeunes de la région sont également plus nombreux, en proportion, à avoir utilisé la contraception régulière seule lors de leur dernière relation sexuelle vaginale (42 % contre 31 %). D'autre part, la proportion d'élèves du secondaire qui n'ont utilisé que le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale est plus faible dans la région (9 %) qu'au Québec (22 %). Ce constat est fait tant chez les filles (8 %\* contre 18 %) que chez les garçons (10 %\* contre 26 %) (tableau 11, données québécoises non illustrées). Enfin, la proportion d'élèves qui n'ont utilisé aucune méthode de contraception régulière et aucun condom est significativement plus faible dans la région qu'au Québec (4,8 %\* contre 8 %).

## Caractéristiques associées à l'usage du condom et d'une méthode contraceptive régulière

Au Québec, les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à avoir utilisé la double protection (40 % contre 37 %) ou seulement le condom (26 % contre 18 %) lors de leur dernière relation sexuelle vaginale tandis que les filles sont plus nombreuses, en proportion, à avoir utilisé seulement une méthode de contraception régulière (36 % contre 26 %) (données non illustrées). Dans la région, l'enquête ne permet pas de détecter de différences significatives selon le genre, le niveau de scolarité, la langue d'enseignement et les territoires locaux (tableau 11).

**Tableau 11 : Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé au moins une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles		Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+							
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« <b>double protection</b> ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	46,3	<b>44,2</b>	38,5	(+)	47,3 (+)	41,6	52,1	49,3	50,9	40,5	40,4	36,7	44,6
Ont utilisé le <b>condom seulement</b>	ND	9,6	<b>8,7</b>	22,1	(-)	9,7* (-)	7,8*(-)	6,2**	6,1**	6,2	8,4**	11,4*	14,7**	X
Ont utilisé une méthode de <b>contraception régulière seulement</b>	ND	39,9	<b>42,3</b>	31,0	(+)	36,9 (+)	46,7 (+)	35,2	42,1	38,2	44,3	45,0	45,0	X
N'ont utilisé <b>ni condom ni méthode contraceptive</b> régulière	ND	4,2*	<b>4,8*</b>	8,5	(-)	6,2*	3,8**(-)	X	X	X	6,9**	3,2**	X	6,4**

**Tableau 12 : Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé au moins une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Pas de diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« <b>double protection</b> ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	51,8	43,6	44,0	49,3	38,5*	53,2	42,5

ND (donnée non disponible) : Indicateur non mesuré en 2010-2011.

(+) ou (-) Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# L'utilisation de la contraception orale d'urgence

---

## En 2022-2023

**19 %** des élèves de sexe féminin de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie ont eu recours à la **contraception orale d'urgence au moins une fois** au cours des 12 mois précédant l'enquête (**17 %** ont eu recours à ce type de contraception **une seule fois** et **2,9 %\*\*** y ont eu recours **deux fois ou plus**).

## Évolution depuis 2016-2017

Dans la région, entre 2016-2017 et 2022-2023, on constate que la proportion d'élèves de sexe féminin ayant eu recours à la contraception orale d'urgence au moins une fois dans les 12 mois précédant l'enquête n'a pas varié de manière significative, passant respectivement de 16 % à 19 % (tableau 13). On constate toutefois que la proportion d'élèves de sexe féminin ayant eu recours à ce type de contraception orale une seule fois dans les 12 mois précédant l'enquête a augmenté significativement entre les deux éditions, passant de 10 % en 2016-2017 à 17 % en 2022-2023 (données non illustrées).

## Comparaison avec le Québec

En Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, on constate que la proportion d'élèves de sexe féminin de 14 ans et plus ayant eu recours à la contraception orale d'urgence au moins une fois au cours des 12 mois ne se distingue pas significativement de celle du Québec (19 % contre 22 %) (tableau 13). Les résultats indiquent cependant qu'elles sont moins nombreuses, en proportion, à avoir eu recours à ce type de contraception deux fois ou plus (3 %\*\* contre 7 %) (données non illustrées).

## Caractéristiques associées à l'utilisation de la contraception orale d'urgence

Au Québec, aucune différence significative n'a été détectée entre le niveau scolaire des élèves et la fréquence d'utilisation de la contraception orale d'urgence (données non illustrés). Dans la région, pour des raisons de confidentialité, les résultats selon le niveau scolaire ne peuvent être présentés. Il en est de même pour la langue d'enseignement et le plus haut niveau de scolarité des parents. En ce qui concerne les résultats à l'échelle locale, aucun territoire ne se démarque significativement du reste de la région (tableau 14).

**Tableau 13 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi celles ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Avignon	Bona-venture	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023								
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	15,6	19,4	21,8	NS	15,9*	25,5*	20,6*	17,3**	19,6*	16,1**	22,8**

**Tableau 14 : Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi celles ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Niveau scolaire		Langue d'enseignement		Plus haut niveau de scolarité des parents		
	1er cycle	2e cycle	Français	Anglais	Pas de diplôme d'études secondaires	Secondaire complété	Postsecondaire
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	X	X	X	X	X	20,9**	19,8

ND (donnée non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

# Attrirance sexuelle et sexe des partenaires sexuels

---

En 2022-2023

## *L'attrirance sexuelle<sup>2</sup>*

Parmi les garçons de 14 ans et plus, **93 %** sont attirés sexuellement par les filles et environ **2 %\*** sont attirés par les garçons.

Parmi les filles de 14 ans et plus, **82 %** sont attirés par les garçons et environ **3 %\*** sont attirées par les filles.

**1,0 %\*** des jeunes de 14 ans et plus sont peu ou pas attirés sexuellement par d'autres.

**2,1 %\*** des jeunes de 14 ans et plus sont incertains à l'égard de leur attrirance sexuelle.

## *Le sexe des partenaires sexuels*

**94,4 %** des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie ont toujours eu des partenaires sexuels de l'autre sexe.

**1,4 %\*\*** ont toujours eu des partenaires sexuels du même sexe qu'eux.

**4,3 %\*** ont eu des relations sexuelles avec des personnes des deux sexes.

## **Évolution depuis 2016-2017**

En ce qui a trait à l'attrirance sexuelle, l'analyse de l'évolution n'est pas possible en raison dans la façon de présenter l'indicateur. Pour les résultats selon le sexe des partenaires sexuels au cours de la vie, l'enquête ne permet pas de détecter des différences significatives entre 2016-2017 et 2022-2023 quant à la proportion des jeunes qui ont toujours eu des relations sexuelles avec des personnes de l'autre sexe (96 % contre 94 %). Il en est de même pour la proportion d'élèves qui ont toujours eu des partenaires sexuels du même sexe (1,3 %\*\* contre 1,4 %\*\*) ou des deux sexes (2,8 %\* contre 4,3 %\*). Au Québec, la proportion des jeunes ayant toujours eu des relations sexuelles avec des personnes de l'autre sexe a diminué (94 % contre 91 %) tandis que la proportion d'élèves qui ont toujours eu des partenaires sexuels du même sexe (1,9 % contre 3,1 %) ou des deux sexes a augmenté (4,6 % contre 6 %) (données non illustrées).

---

<sup>2</sup> La mesure de l'attrirance sexuelle est fondée sur l'identité et l'expression de genre de l'autre personne, car les renseignements sur le sexe à la naissance (ou même le sexe actuel) ne sont pas nécessairement connus par la personne attirée au moment où l'attrirance se manifeste.

## Comparaison avec le Québec

En ce qui a trait à l'**attirance sexuelle**, les résultats de l'EQSJS 2022-2023 indiquent que la proportion d'élèves qui sont peu ou pas attirés sexuellement par d'autres personnes est significativement plus faible dans la région qu'au Québec (1,0 % contre 2,1 %) (tableau 15). Il en va de même pour les jeunes de la région qui sont moins nombreux, en proportion, à être incertains à l'égard de leur attirance sexuelle en comparaison à ceux du Québec (2,1 %\* contre 3,2 %) (tableau 15).

Concernant le **sexe des partenaires sexuels** au cours de la vie, les résultats indiquent que les élèves du secondaire de la région sont plus susceptibles, en proportion, que ceux du Québec d'avoir toujours eu des relations sexuelles avec des personnes de l'autre sexe (94 % contre 91 %) (tableau 16). Par ailleurs, les jeunes de la région sont proportionnellement moins nombreux à toujours avoir eu des relations sexuelles avec des personnes du même sexe (1,4 %\*\* contre 3,8 %\*) (tableau 16).

## Caractéristiques associées à l'orientation sexuelle

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comme au Québec, les filles sont plus nombreuses, en proportion, que les garçons à être incertaines à l'égard de leur attirance sexuelle (2,9 %\* contre 1,2 %\*\*) (tableau 15). L'enquête ne permet pas de déceler des différences significatives selon le niveau scolaire des élèves ou la langue d'enseignement de l'école en raison des règles de confidentialité. Il en va de même pour les résultats associés au sexe des partenaires sexuels selon le genre, le niveau scolaire et la langue d'enseignement.

Les résultats selon le territoire local de l'école ne peuvent être présentés en raison des règles de confidentialité.

**Tableau 15 : Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus selon leur attirance sexuelle, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2022-2023**

	Gaspésie-Îles			Québec		
	Total	Garçons+	Filles+	Total	Garçons+	Filles+
<b>Attirance sexuelle</b>						
Attirance envers les garçons	42,0 (+)	1,6* <sup>a</sup>	82,0 (+) <sup>a</sup>	39,2	2,4 <sup>a</sup>	78,5 <sup>a</sup>
Attirance envers les filles	47,9	93,6 (+) <sup>a</sup>	2,8* <sup>a</sup>	48,7	90,9 <sup>a</sup>	3,6 <sup>a</sup>
Attirance envers des personnes, quel que soit leur genre	X	X	X	6,7	2,6 <sup>a</sup>	11,0 <sup>a</sup>
Attirance envers des personnes non binaires	X	X	X	0,1*	0,2*	0,1**
Peu ou pas attiré(e) sexuellement par d'autres personnes	1,0*(-)	1,0**	1,0**(-)	2,1	1,9	2,3
Attirance incertaine	2,1*(-)	1,2** <sup>a</sup>	2,9*(-) <sup>a</sup>	3,2	2,1 <sup>a</sup>	4,5 <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Les catégories avec les mêmes lettres signifient qu'il y a une différence significative entre les filles+ et les garçons+.

(+) ou (-) Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence. \*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

**Tableau 16 : Sexe des partenaires sexuels au cours de la vie, élèves du secondaire de 14 ans et plus, 2016-2017 et 2022-2023**

	Gaspésie-Îles			Québec	GÎM vs Québec	Gaspésie-Îles	
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2022-2023		Garçons+	Filles+
<b>Sexe des partenaires sexuels</b>							
Ont toujours eu des relations sexuelles toujours avec des personnes de l'autre sexe.	ND	95,9	94,4	91,1	(+)	96,6	92,5 (+)
Ont toujours eu des relations sexuelles toujours avec des personnes du même sexe qu'eux.	ND	1,3**	1,4**	3,1	(-)	X	X
Ont eu des relations sexuelles avec des personnes des deux sexes.	ND	2,8*	4,3*	5,8	NS	X	X

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

(+) ou (-) Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

NS : Valeur non significativement différente de celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, 2022-2023, données tirées des tableaux réalisés par l'ISQ, [La santé des jeunes du secondaire en 2022-2023 \(quebec.ca\)](#).

# Les comportements sexuels selon certaines caractéristiques

Les données de l'EQSJS 2022-2023 indiquent également que certains comportements sexuels varient selon certaines caractéristiques de l'environnement social des jeunes et certaines habitudes de vie. Dans la région, on constate que les jeunes dont le **niveau de supervision parentale** est élevé sont moins nombreux, en proportion, à avoir eu des relations sexuelles et à avoir eu trois partenaires ou plus au cours de leur vie. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle consensuelle vaginale.

Il en va de même pour certaines habitudes de vie telles que le fait d'avoir consommé des **drogues** au cours de la vie. Toutes proportions gardées, les jeunes ayant consommé de la drogue au cours de leur vie sont plus nombreux à avoir eu des relations sexuelles consensuelles, à avoir eu trois partenaires ou plus et moins nombreux à avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale ou anale.

**Tableau 17 : Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire selon certaines caractéristiques de l'environnement social des jeunes, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Supervision parentale		Soutien social dans la famille		Soutien social à l'école		Soutien social provenant des amis		Soutien social dans la communauté	
	Élevé	Faible ou moyen	Élevé	Faible ou moyen	Élevé	Faible ou moyen	Élevé	Faible ou moyen	Élevé	Faible ou moyen
<b>Relations sexuelles à vie</b>										
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	36,4 <sup>a</sup>	45,8 <sup>a</sup>	41,5	45,9	38,5	43,5	46,7 <sup>a</sup>	35,0 <sup>a</sup>	43,0	40,7
<b>Nombre de partenaires sexuels</b>										
Ont eu trois partenaires ou plus	22,1 <sup>a</sup>	33,0 <sup>a</sup>	27,8	35,9	30,9	32,1	30,6	28,7	30,6	32,5
<b>L'usage du condom</b>										
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	60,0 <sup>a</sup>	49,8 <sup>a</sup>	53,3	52,9	50,8	49,2	52,9	53,9	48,4	50,7
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	45,0*	41,2	39,3	50,2*	34,3**	46,1	45,0	35,1*	34,7*	48,1*
<b>Contraception orale d'urgence</b>										
Ont utilisé au moins une fois la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	16,5*	21,3	18,5	22,3*	23,5*	18,1*	19,4	19,5*	22,0*	17,2*

**Tableau 18 : Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire selon certaines habitudes de vie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2022-2023**

	Fumeur actuel <sup>3</sup> de cigarette		Consommation d'alcool au cours de la vie		Consommation de drogues au cours de la vie	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
<b>Relations sexuelles à vie</b>						
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	84,0 <sup>a</sup>	40,0 <sup>a</sup>	49,5 <sup>a</sup>	9,8* <sup>a</sup>	73,3 <sup>a</sup>	25,8 <sup>a</sup>
<b>Nombre de partenaires sexuels</b>						
Ont eu trois partenaires ou plus	54,9 <sup>a</sup>	26,2 <sup>a</sup>	X	X	59,7 <sup>a</sup>	20,7 <sup>a</sup>
<b>L'usage du condom</b>						
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	49,3	54,3	X	X	45,3 <sup>a</sup>	66,2 <sup>a</sup>
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	35,8**	42,1	X	X	37,2 <sup>a</sup>	54,4 <sup>a</sup>
<b>Contraception orale d'urgence</b>						
Ont utilisé au moins une fois la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	26,1**	18,3	18,7	35,7**	20,9	15,7*

<sup>a</sup> Pour un indicateur donné, les catégories d'une variable de croisement (supervision parentale, fumeur actuel, etc.) avec les mêmes lettres se différencient significativement les unes des autres.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence. \*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

<sup>3</sup> Les fumeuses et fumeurs actuels regroupe les fumeuses et fumeurs quotidiens et occasionnels. Les fumeuses et fumeurs quotidiens sont des élèves qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ont fumé la cigarette tous les jours au cours des 30 derniers jours. Les fumeuses et fumeurs occasionnels sont des élèves qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ont fumé moins souvent que tous les jours au cours des 30 derniers jours.

# Les actions en place

Face à ces constats, il est important de mentionner que plusieurs actions sont déployées sur le territoire afin de développer une sexualité saine et responsable auprès des jeunes. Pour se faire, il est reconnu qu'il faut travailler autant sur le développement des compétences personnelles et sociales que sur les actions qui favorisent la création d'environnements favorables. Ainsi, les actions en place visent à :

- Intervenir le plus tôt possible pour **diminuer les facteurs de risque et renforcer les facteurs de protection chez les jeunes**, notamment en matière d'ITSS et de grossesses non planifiées à l'adolescence, de violence dans les relations amoureuses et d'agressions sexuelles.
- Favoriser un environnement favorable à une sexualité saine et responsable par la **mise en place et le respect de cadres qui font la promotion de valeurs phares liées à la sexualité dans les milieux de vie des jeunes**. La promotion de la santé sexuelle chez les jeunes adopte une vision globale et positive, tout en privilégiant l'établissement de rapports harmonieux et égalitaires exempts de discrimination, de stéréotypes et de violence.

La promotion et la prévention en matière de sexualité saine et responsable auprès des jeunes est une responsabilité partagée qui demande un partenariat de tous les acteurs impliqués auprès des jeunes (parents, réseau de la santé et des services sociaux, réseau de l'éducation, organismes communautaires, municipalités).

Dans la région, des actions sont déployées par la Direction de santé publique dans les différents milieux de vie (école, famille, communauté), et ce, partout sur le territoire. Par exemple :

- Les infirmiers(ères) scolaires offrent des services de type « clinique jeunesse » aux jeunes en réponse à leurs besoins en contraception et de dépistage ITSS et soutiennent les enseignants dans des activités d'éducation à la santé sexuelle en lien avec le Cours culture et citoyenneté québécoise.
- Les accompagnateurs(trices) École en santé (AÉS) soutiennent les milieux scolaires dans une démarche structurante conforme au référent EKIP et planifient les diverses activités en lien avec la santé sexuelle telles; les kiosques, les organismes communautaires, les pièces de théâtres, etc.
- Kiosques et campagnes de sensibilisation en milieu scolaire sur divers thèmes de santé sexuelle.
- Formation des infirmiers(ères) scolaires en matière de mise à jour en contraception jeunesse.
- Pièces de théâtre à vocation éducative et préventive traitant de thèmes comme la prévention des grossesses à l'adolescence, les ITSS et le consentement.
- Installation de nouvelles distributrices à condoms gratuites dans les écoles secondaires et offre de condoms gratuits pour les maisons des jeunes et l'éducation des Adultes.
- Formations offerte aux équipes-écoles et leurs partenaires pour favoriser l'inclusion des personnes LGBTQ+.
- Diffusion de bulletins d'information pour les parents.
- Services des infirmiers(ères) SIDEP hors milieu scolaire pour le dépistage ITSS et la contraception.

En somme, il importe de poursuivre nos efforts en partenariat avec les acteurs et actrices du milieu afin de développer et renforcer les comportements sains et responsables des jeunes en matière de sexualité.

# Conclusion

---

En terminant, l'objectif de ce document était de présenter les principaux résultats sur les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus des écoles secondaires de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de voir l'évolution dans le temps, de comparer les résultats de la région avec ceux du Québec et de rendre compte des différences selon certaines caractéristiques des élèves et de leur environnement.

**Par rapport à l'édition de 2010-2011**, en 2022-2023, on observe une **diminution** de la proportion d'élèves du secondaire de 14 ans et plus qui ont eu une **relation sexuelle consensuelle** au moins une fois au cours de leur vie et de la proportion de jeunes de 14 ans et plus ayant eu leur **première relation sexuelle avant 14 ans**. On note cependant une **diminution** de la proportion de jeunes qui ont utilisé **le condom** lors de leur dernière relation sexuelle vaginale ou anale.

**Par rapport à l'édition de 2016-2017**, en 2022-2023, on note une **augmentation** de la proportion d'élèves du secondaire ayant eu recours aux **méthodes à longue durée d'action** (stérilet ou implant contraceptif) lors de leur dernière relation sexuelle vaginale. Il y a également une augmentation de la proportion ayant utilisé une fois la contraception orale d'urgence tandis qu'une diminution

La **situation est parfois défavorable dans la région par rapport au reste du Québec**. En effet, la proportion de jeunes de 14 ans et plus ayant eu une **relation sexuelle consensuelle** (orale, vaginale ou anale) au moins une fois au cours de leur vie ainsi que la proportion de jeunes ayant eu une première relation sexuelle avant 14 ans sont plus élevées dans la région qu'au Québec. L'**utilisation du condom** lors de la dernière relation sexuelle consensuelle vaginale ou anale est aussi un point en défaveur de notre région. À l'inverse, la **situation est parfois favorable dans la région par rapport au Québec**, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'au moins une **méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action** lors de la dernière relation sexuelle vaginale ainsi que l'utilisation de la **double protection** (condom et méthode de contraception régulière).

Les **filles** sont, en proportion, plus nombreuses que les garçons à avoir eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie. Elles sont aussi plus nombreuses à être incertaines de leur attirance sexuelle. Au chapitre des méthodes contraceptives, les **garçons** sont proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé une méthode à longue durée d'action ou une méthode naturelle.

Toutes proportions gardées, les élèves de **2<sup>e</sup> cycle** sont plus nombreux à avoir eu au moins une relation sexuelle consensuelle et à avoir eu trois partenaires sexuels ou plus au cours de leur vie. Ils sont également moins nombreux, en proportion, à avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale et plus nombreux à avoir utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de leur dernière relation sexuelle vaginale. On constate peu de différences significatives en fonction de la langue d'enseignement sinon que les élèves de 14 ans et plus dans les écoles anglophones sont, en proportion, moins nombreux que ceux dans les **écoles francophones** à avoir eu une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au moins une fois au cours de leur vie.

Enfin, on constate que certaines caractéristiques de l'environnement social des jeunes et certaines habitudes de vie sont liées à certains comportements sexuels tels que l'activité sexuelle, le nombre de partenaires sexuels et l'utilisation du condom.

**Tableau 19 : Indicateurs pour lesquels la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a connu une amélioration ou une détérioration en 2022-2023 par rapport à 2010-2011 ou 2016-2017**

Amélioration	Détérioration
Baisse de la proportion de jeunes qui ont eu une relation sexuelle consensuelle au moins une fois au cours de leur vie entre 2010-2011 et 2022-2023	Baisse de la proportion de jeunes qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale entre 2010-2011 et 2022-2023
Baisse de la proportion de jeunes qui ont eu leur première relation sexuelle avant 14 ans entre 2010-2011 et 2022-2023	Baisse de la proportion de jeunes qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale entre 2010-2011 et 2022-2023
Hausse de la proportion de jeunes ayant utilisé une méthode contraceptive à longue action comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle entre 2016-2017 et 2022-2023	

**Tableau 20 : Indicateurs pour lesquels la situation est en faveur ou en défaveur en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par rapport au Québec en 2022-2023**

En faveur de la région	En défaveur de la région
Proportion de jeunes ayant utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de leur dernière relation sexuelle vaginale plus élevée dans la région.	Proportion de jeunes qui ont eu une relation sexuelle consensuelle au moins une fois au cours de leur vie plus élevée dans la région.
Proportion de jeunes ayant utilisé un condom et une méthode de contraception régulière (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale plus élevée dans la région.	Proportion de jeunes qui ont eu leur première relation sexuelle avant 14 ans plus élevée dans la région.
	Proportion de jeunes qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale plus faible dans la région.
	Proportion de jeunes qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle anale plus faible dans la région.

# Bibliographie

---

BOUCHER, Maxime, et Marie-Eve TREMBLAY (2024). Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023. Méthodologie de l'enquête, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 51 p. [[statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023-methodologie.pdf](https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023-methodologie.pdf)]

TRAORÉ, Issouf, Micha SIMARD et Dominic JULIEN (2024). Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Résultats de la troisième édition – 2022-2023, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 759 p. [[statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf](https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf)]

# Annexe 1 : Évolution 2010-2011 à 2022-2023 par RLS

## Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire dans le RLS Baie-des-Chaleurs, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023

	2010-2011	2016-2017	2022-2023
<b>Les relations consensuelles</b>			
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	46,6	41,3	43,1
<b>La précocité de la première relation sexuelle consensuelle</b>			
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	15,4 <sup>a</sup>	8,3 <sup>a</sup>	11,6 <sup>a</sup>
<b>L'usage du condom</b>			
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	70,1 <sup>a,b</sup>	61,2 <sup>a</sup>	57,3 <sup>b</sup>
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	59,2	51,0	52,9
<b>Utilisation des méthodes de contraception</b>			
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	85,4	89,6
<b>L'utilisation conjointe d'un condom et d'une méthode de contraception régulière</b>			
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	48,5	50,9
<b>Utilisation de la contraception orale d'urgence</b>			
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	x	20,6*

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Pour un indicateur donné, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions des différentes éditions de l'enquête.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

## Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire dans le RLS Rocher-Percé, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023

	2010-2011	2016-2017	2022-2023
<b>Les relations consensuelles</b>			
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	49,4	48,9	49,4
<b>La précocité de la première relation sexuelle consensuelle</b>			
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	15,3	11,8*	18,8
<b>L'usage du condom</b>			
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	65,6 <sup>a b</sup>	52,7 <sup>a</sup>	49,7 <sup>b</sup>
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle anale consensuelle	63,1 <sup>a</sup>	45,2*	25,5* <sup>a</sup>
<b>Utilisation des méthodes de contraception</b>			
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	86,2	85,6
<b>L'utilisation conjointe d'un condom et d'une méthode de contraception régulière</b>			
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	42,8	40,5
<b>Utilisation de la contraception orale d'urgence</b>			
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	14,1**	17,3**

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Pour un indicateur donné, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions des différentes éditions de l'enquête.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

## Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire dans le RLS de La Côte-de-Gaspé, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023

	2010-2011	2016-2017	2022-2023
<b>Les relations consensuelles</b>			
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	46,7 <sup>a</sup>	46,4 <sup>b</sup>	39,2 <sup>a,b</sup>
<b>La précocité de la première relation sexuelle consensuelle</b>			
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	14,8	13,8	10,3
<b>L'usage du condom</b>			
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	65,3 <sup>a</sup>	57,9	51,8 <sup>a</sup>
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	54,3	49,1*	46,9*
<b>Utilisation des méthodes de contraception</b>			
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	88,3	86,3
<b>L'utilisation conjointe d'un condom et d'une méthode de contraception régulière</b>			
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	50,7 <sup>a</sup>	40,4 <sup>a</sup>
<b>Utilisation de la contraception orale d'urgence</b>			
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	9,9**	19,6*

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Pour un indicateur donné, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions des différentes éditions de l'enquête.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

## Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire dans le RLS Haute-Gaspésie, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023

	2010-2011	2016-2017	2022-2023
<b>Les relations consensuelles</b>			
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	53,4 <sup>a,b</sup>	40,3 <sup>a</sup>	40,0 <sup>b</sup>
<b>La précocité de la première relation sexuelle consensuelle</b>			
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	19,0 <sup>a,b</sup>	11,7 <sup>*a</sup>	12,1 <sup>*b</sup>
<b>L'usage du condom</b>			
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	68,7 <sup>a</sup>	55,8	52,5 <sup>a</sup>
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	56,8 <sup>*</sup>	44,6 <sup>**</sup>	43,1 <sup>**</sup>
<b>Utilisation des méthodes de contraception</b>			
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	87,2	81,7
<b>L'utilisation conjointe d'un condom et d'une méthode de contraception régulière</b>			
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	47,9	36,7
<b>Utilisation de la contraception orale d'urgence</b>			
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	x	16,1 <sup>**</sup>

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Pour un indicateur donné, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions des différentes éditions de l'enquête.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée confidentielle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

## Les comportements sexuels des jeunes de 14 ans et plus au secondaire dans le RLS Îles-de-la-Madeleine, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023

	2010-2011	2016-2017	2022-2023
<b>Les relations consensuelles</b>			
Ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours de leur vie	49,7 <sup>a,b</sup>	39,1 <sup>a</sup>	39,1 <sup>b</sup>
<b>La précocité de la première relation sexuelle consensuelle</b>			
Ont eu une première relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) avant l'âge de 14 ans	12,2	9,5*	9,0*
<b>L'usage du condom</b>			
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>vaginale</u> consensuelle	41,8	45,2	49,6
Ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle <u>anale</u> consensuelle	42,1*	48,6*	57,2*
<b>Utilisation des méthodes de contraception</b>			
Ont utilisé au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	86,8	88,6
<b>L'utilisation conjointe d'un condom et d'une méthode de contraception régulière</b>			
Ont utilisé une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	ND	37,7	44,6
<b>Utilisation de la contraception orale d'urgence</b>			
Ont utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois, parmi les filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie	ND	17,6**	22,8**

ND (non disponible) : Cet indicateur n'a pas été mesuré en 2010-2011.

<sup>a, b</sup> Pour un indicateur donné, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions des différentes éditions de l'enquête.

\*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

\*\*CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 2016-2017, 2022-2023, données extraites de l'Infocentre de santé publique.